

Ficha Técnica

Nombre comercial: Biobea®

Ingredientes activos: *Beauveria bassiana*

Tipo de producto: Insecticida biológico

Formulación: Polvo humectable

Concentración:

INGREDIENTES ACTIVOS:	%
<i>Beauveria bassiana</i>	
No menos de.....	20.00%
(Equivalente a 200 g de i.a/Kg a 20 °C) Con un contenido de 1.0 x 10 ⁸ UFC/g	
INGREDIENTES INERTES:	
Diluyente.....	80.00%
TOTAL	100.00%

Presentaciones: 250 g, 500 g y 1 Kg.

No de Registro COFEPRIS: RSCO-INAC-0195-X0301-417-20

Certificado OMRI: bmn-6905



PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
 PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
 PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 5, PRECAUCIÓN. BANDA VERDE

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
 INSTRUCCIONES DE USO
 SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

Cultivo	Plaga	Dosis	Observaciones
Berenjena, Chile, Chile bell, Jitomate, Tomate de cáscara (0)	Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>)	400 - 600 g por ha	Realizar tres aplicaciones al follaje en intervalos de 7 días, cuando se detecta la presencia de plaga. Volumen de aplicación: 235 - 335 L de agua/Ha.
Arándano, Fresa, Frambuesa, Grosella, Zarzamora, Vid, Kiwi (0)	Mosca blanca (<i>Trialeurodes sp</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	400-600 g por ha	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se detecte la presencia de la plaga. Volumen de agua: 464.50 - 475.29 Litros por ha.

() Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y cosecha.

Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: Puede reentrarse al cultivo tratado una vez que la aplicación se ha secado.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Abra el empaque con unas tijeras, pese la cantidad de producto a utilizar con la ayuda de una báscula o con algún otro utensilio graduado específico para este uso. Mezcle en un recipiente la cantidad de producto a utilizar con agua, agite, posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión.

Durante el manejo, preparación y aplicación del producto utilizar el equipo de protección personal como lo son: camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes protectores de plástico transparente, mascarilla para polvos, guantes de neopreno y botas de hule con casquillo.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar en horas de calor intenso: cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD: Biobea® no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD QUÍMICA: No se recomienda Biobea® en mezclas en tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta, sin embargo es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación

MANEJO DE RESISTENCIA: Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación. Evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

